

Nombres de Armstrong à trois chiffres [lp07] - Examen

Karine Zampieri, Stéphane Rivière

Unisciel

sciel

algotprog

UNIVERSITÉ
HAUTE-ALSACE

Version 17 mai 2018

Table des matières

1	Nombres de Armstrong / pgarmstrong	2
1.1	Nombres d'Armstrong à trois chiffres	2
1.2	Trois itératives imbriquées	2
1.3	Une seule itérative	2
2	Nombre de Armstrong (6 points)	4

Python - Nombres d'Armstrong (Examen)



Objectif

Cet exercice détermine par force brute les nombres de ARMSTRONG à trois chiffres.
(image : google/images)

$$371 = 3^3 + 7^3 + 1^3$$

...(énoncé page suivante)...

1 Nombres de Armstrong / pgarmstrong

1.1 Nombres d'Armstrong à trois chiffres



Définition

Un entier positif n à trois chiffres est un nombre de ARMSTRONG si la somme des cubes de ses chiffres est égale au nombre. Autrement dit, soit $n = \overline{cba} = 100 \times c + 10 \times b + a$ (où a, b, c sont les chiffres de n). Si :

$$n = a^3 + b^3 + c^3$$

Exemple

$153 = 1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27 = 153$ est un nombre d'ARMSTRONG ainsi que 371.

1.2 Trois itératives imbriquées

Une première méthode consiste donc à utiliser **trois itératives imbriquées** pour passer en revue tous les nombres de 100 à 999 :

- Pour les chiffres de la centaine de 1 à 9
 - Pour les chiffres de la dizaine de 0 à 9
 - Pour les chiffres de l'unité de 0 à 9
 - Tester la combinaison (centaine, dizaine, unité)



Écrivez un script qui recherche et affiche **tous** les entiers de ARMSTRONG compris entre 100 et 999 en utilisant **trois boucles Pour imbriquées** de compteurs **c** (centaine), **b** (dizaine) et **a** (unité).



Testez (quatre solutions).

Résultat d'exécution :

```
==> 153
==> 370
==> 371
==> 407
FIN
```

1.3 Une seule itérative

Une autre méthode consiste à passer en revue tous les nombres de 100 à 999 et à récupérer les chiffres de la centaine, la dizaine et l'unité.



Soit n un entier.

- Quelle est l'action d'une division par 10 sur n ?
- Et celle du modulo ?

Exemple : n vaut 395.



Complétez votre script pour que, utilisant **une seule** répétitive, il trouve par force brute toutes les combinaisons et les affiche au fur et à mesure.

Aide détaillée

La répétitive doit passer en revue tous les entiers n de 100 à 999.

Dans celle-ci :

- Récupérez le chiffre des unités dans a , des dizaines dans b et celui des centaines dans c . Rappel : l'opération modulo par 10 permet de récupérer le dernier chiffre d'un entier et la division par 10 fait perdre son dernier chiffre.
- Testez la combinaison (centaine, dizaine, unité).



Testez. (Les mêmes quatre solutions ci-dessus.)

2 Nombre de Armstrong (6 points)



Objectif

Un nombre de AMSTRONG est un entier positif dont la somme des cubes des chiffres vaut cet entier. Exemple : $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27 = 153$. Déterminer les nombres de AMSTRONG à trois chiffres.



(3 points) Écrivez un script qui calcule et affiche tous les entiers de AMSTRONG compris entre 100 et 999 en utilisant **trois** boucles **Pour imbriquées**.



Testez. (voir plus bas)



(2 points) Faites de même en utilisant **une seule** boucle **Pour**.



(1 point) Dans une des deux boucles de recherche, ajoutez les instructions qui comptent le nombre d'entiers vérifiant la relation puis affichez-le.



Testez. Résultat d'exécution :

```
==> 039
==> 066
==> 093
==> 309
==> 336
==> 363
==> 390
==> 606
==> 633
==> 660
==> 903
==> 930
FIN
```